

نیمرخ آمادگی جسمانی و آنتروپومتریک بازیکنان تیم ملی هاکی روی چمن ایران در پست‌های مختلف

علی بختیاری^۱، خسرو ابراهیم^۲، حبیب آقایی^۳، ابوالفضل یوسفی^۴

چکیده

زمینه و هدف: آمادگی جسمانی و شکل و ساختمان بدن، نقش مهمی در موفقیت ورزشکاران دارد، از این رو هدف پژوهش حاضر تعیین نیمرخ آمادگی جسمانی و آنتروپومتریک بازیکنان تیم ملی هاکی روی چمن ایران بود.

روش تحقیق: ۲۹ بازیکن حاضر در اردیه تیم ملی ایران با میانگین سنی $۲۳/۴۲\pm ۳/۶۱$ سال، قد $۱۷۶/۸\pm ۷/۱۷$ سانتیمتر و وزن $۷۱/۶۲\pm ۸/۲۳$ کیلوگرم به صورت داوطلبانه در تحقیق شرکت کردند. این افراد از پست‌های چهارگانه دروازه بان (۴ نفر)، هافبک (۱۰ نفر) و مهاجم (۵ نفر) بودند. شاخص‌های آنتروپومتریک شامل وزن، قد، شاخص توده بدن، قد نشسته و طول دست‌ها با استفاده از روش‌های استاندارد و شاخص‌های آمادگی جسمانی با استفاده از آزمون‌های دوی رفت و برگشت ۳۶ متر، ایلینویز، ۲۰×۱۰ متر، پرش طول جفت، خمش به جلو، ۱۶۰۰ متر، درازونشست و آزمون پرش زیگزاگ مورد سنجش قرار گرفتند. عملیات آماری با استفاده از نرم افزار SPSS^{۲۰} و EXCEL انجام پذیرفت و نیمرخ آمادگی جسمانی و آنتروپومتریک بازیکنان هر پست تهیه گردید.

یافته‌ها: شاخص توده بدن برای دروازه بان‌ها، مدافعانه، هافبک‌ها و مهاجم‌ها به ترتیب $۹۳/۵۱\pm ۴/۹۱$ ، $۹۴/۲۱\pm ۵/۱۱$ ، $۹۴\pm ۴/۷۱$ ، $۹۳/۱۱\pm ۲/۴۱$ ، $۹۳/۲۱\pm ۱/۲۰$ ، $۹۳/۲۱\pm ۱/۶۰$ ، $۹۳/۱۱\pm ۱/۶$ ، $۹۷/۲۱\pm ۳/۵۱$ سانتیمتر، طول دست‌ها $۱۸۱/۲۳\pm ۶/۱۱$ ، $۱۸۰/۴۴\pm ۸/۶۳$ ، $۱۷۷/۷۴\pm ۸/۰۶$ ، $۱۸۰/۴۴\pm ۸/۶۳$ ، $۱۷۷/۷۴\pm ۸/۰۶$ ، $۱۷۰/۴۴\pm ۸/۰۶$ سانتیمتر، سرعت $۱۵/۲۹\pm ۰/۲۸$ ، $۱۵/۰۲\pm ۰/۱۱$ ، $۱۵/۱۱\pm ۰/۰۹$ ، $۱۴/۹۹\pm ۰/۲۲$ ، $۱۴/۰۲\pm ۰/۱۱$ ، $۱۴/۸۵\pm ۰/۰۵$ ثانیه، چابکی $۱۵/۱\pm ۰/۰۹$ ، $۱۵/۰۴\pm ۰/۰۹$ ، $۱۵/۰۲\pm ۰/۰۹$ ، $۱۵/۰۱\pm ۰/۰۹$ ثانیه، استقامت در سرعت $۴۴/۳۷\pm ۰/۰۸$ ، $۴۴/۲۳\pm ۰/۰۶$ ، $۴۴/۰۷\pm ۰/۰۷$ ، $۴۴/۰۷\pm ۰/۰۷$ ثانیه، توان اندام تحتانی $۳۵/۰۸\pm ۰/۰۴$ ، $۳۵/۰۸\pm ۰/۰۴$ ، $۳۵/۰۸\pm ۰/۰۴$ ، $۳۵/۰۸\pm ۰/۰۴$ سانتیمتر، انعطاف‌پذیری، $۳۶\pm ۵/۹۳$ ثانیه، استقامت $۳۶۸\pm ۰/۰۲$ ، $۳۴۲\pm ۰/۰۲$ ، $۳۴۲\pm ۰/۰۲$ ، ۳۵۷ ثانیه، استقامت $۲۷/۴۲\pm ۱۰/۸۲$ ، $۳۲/۶۱\pm ۷/۷۰$ سانتیمتر، استقامت قلبی-عروقی $۶۳/۷۶\pm ۶/۲۱$ ، $۶۳/۷۶\pm ۶/۲۱$ ، $۶۱/۷۸\pm ۴/۳۵$ ، $۵۷/۶۸\pm ۴/۵۹$ ، $۵۷/۶۸\pm ۴/۵۹$ تعداد و استقامت عضلات اندام تحتانی $۱۴۰/۰۶۰\pm ۱۰/۹۰$ ، $۱۴۰/۰۳۲\pm ۱۳/۶۰$ ، $۱۴۰/۰۵۲\pm ۵/۵۰$ ، $۱۴۰/۰۵۲\pm ۵/۵۰$ عضلات ناحیه شکمی $۵۶/۴۹\pm ۴/۸۴$ ، $۵۷/۶۸\pm ۴/۵۹$ تعداد به دست آمد.

نتیجه‌گیری: شاخص‌های آنتروپومتریک بازیکنان ایرانی در پست‌های مختلف بازی از سطح مطلوبی برخوردار است، اما در مورد اکثر شاخص‌های آمادگی جسمانی ضعف‌هایی مشاهده می‌شود.

واژه‌گان کلیدی: آمادگی جسمانی، استعدادیابی، آنتروپومتری، هاکی روی چمن.

۱. نویسنده مسئول، کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران؛ آدرس: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی؛

پست الکترونیک: bakhtiyari.ali2012@gmail.com

۲. استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

۳. کارشناسی ارشد تربیت بدنی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

۴. کارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات، اراک، ایران.

مقدمه

مذکور قد بازیکنان هاکی اختلاف معنی داری با افراد غیر ورزشکار نداشت که می‌تواند دال بر آن باشد که احتمالاً قد عامل خیلی تاثیرگذاری نیست. همچنین درصد چربی در بازیکنان دفاع و دروازه بانان به طور معنی داری بیشتر از بازیکنان مهاجم بود که می‌تواند به دلیل متفاوت بودن نوع تمرين بازیکنان هاکی در پستهای مختلف باشد. علاوه بر این، نشان داده شد که مهاجم ها نیازمند سطح بالایی از توان هوایی و بی هوایی هستند (۹). دموث^۴ و همکارانش در سال ۲۰۰۷ به بررسی وضعیت آنتروپومتریکی بازیکنان هاکی تیم‌های ملی چین، مالزی، لهستان و سوئیس پرداخته و گزارش کردند که افراد هاکی بازیکنان اروپایی دارای قد، وزن و حجم عضلانی بالاتری هستند و دارای تیپبدنی بدنی عضلانی (مزومورف) می‌باشند (۱۲). کونارسکی و ماتسزینسکی^۵ در سال ۲۰۰۶ تفاوت‌های ضربان قلب در طول بازی هاکی روی چمن را در ۱۰ نفر از بازیکنان تیم ملی لهستان، در پستهای مختلف بازی بررسی کردند. نتایج نشان داد که میانگین حداکثر تعداد ضربان قلب در دقیقه هافبک‌ها (۱۸۶/۷۵) بیشتر از مهاجم ها (۱۸۵/۶۷) و مدافع ها (۱۸۵/۳۳) است. میانگین ضربان قلب در تمام طول بازی برای تمامی پست‌ها ۱۳۰ ضربه در دقیقه بود و میانگین کل میزان انرژی مصرفی بازیکنان ۸۸۹/۷۰ کیلوکالری گزارش شد به طوری که این میزان در مدافع ها (۹۹۵ کیلوکالری) بیشتر از هافبک‌ها (۸۴۵/۴۰) و مهاجم ها (۸۲۷ کیلوکالری) بود. (۲۳). سینگ^۶ و همکاران (۲۰۰۹) ترکیب بدنی و شاخص‌های آنتروپومتریک ۵۳ بازیکن تیم‌های ملی هند، پاکستان و سریلانکا را مورد ارزیابی قرار داده و تفاوت معنی داری در میزان قد و وزن بازیکنان مشاهده نکردند، اما طول دست بازیکنان پاکستانی در مقایسه با بازیکنان هندی و سریلانکایی، به طور معنی داری بالاتر بود. محیط مج دست بازیکنان سریلانکایی نیز به شکل معنی داری

اجرای بهینه و مطلوب مهارت‌های ورزشی ناشی از تعامل پیچیده عوامل فیزیولوژیک، آنتروپومتریک، روان‌شناسی و زیست حرکتی با یکدیگر است (۱۴، ۶). ورزش هاکی^۱ به عنوان یک ورزش گروهی دسته‌بندی می‌شود و پیدایش آن به گفته بسیاری از مورخان در مصر، ایران و یونانیان باستان؛ به هزاران سال قبل از اولین مسابقات المپیک سال ۷۷۶ قبل از میلاد بر می‌گردد. اولین انجمن هاکی در سال ۱۸۷۳ تشکیل شد و رقابت‌های بین‌المللی هاکی از اولیل سال ۱۸۹۵ آغاز گردید. این ورزش بین دو تیم یازده نفره برگزار می‌شود (۱، ۳). موقفيت در هاکی روی چمن به عوامل متعددی از قبیل سرعت، چاپکی، انعطاف پذیری، توان هوایی و بی هوایی بستگی دارد و بازیکنان موفق داری ویژگی‌های جسمانی و روانی بر جسته هستند (۳۱). رشته‌ورزشی هاکی الگوهای حرکت‌هایی همانند راه رفتن، آهسته دویدن، دوی سرعت در جهات مختلف به وسیله توب و یا بدون توب را شامل می‌شود؛ بنابراین به توان هوایی و بی هوایی بالایی نیاز دارد، ۲۵، ۳۰، ۲۶. بازیکنان هاکی روی چمن با توجه به پست خود، مسافت‌های مختلفی را طی هنگام بازی طی می‌کنند به طوری که این میزان در هافبک‌ها به ۱۰ کیلومتر، مدافع ها و مهاجم ها ۸-۹ کیلومتر و دروازه‌بانان کمتر از ۱-۲ کیلومتر می‌رسد (۲۴، ۳۰). در پژوهش‌های انجام شده میزان توان هوایی بازیکنان هاکی روی چمن حدود ۴۸-۶۵ میلی لیتر/کیلوگرم/دقیقه گزارش شده است (۲۸)، اما این ویژگی‌ها می‌توانند در هر پست متفاوت باشد.

بانوت و سیدهو^۲ در سال ۱۹۸۳ توان بی هوایی ۹۰ نفر از هاکی بازان نخبه هند را در پستهای مختلف بررسی کرده و نشان دادند که توان بی هوایی در دروازه‌بانان بیشتر از مدافعان، هافبک‌ها و مهاجمان است (۴). کالو^۳ و همکاران در سال ۲۰۰۹ ترکیب بدنی بازیکنان هاکی زن ایتالیا را مورد ارزیابی قرار داده و نشان دادند که میزان درصد چربی این افراد غیر ورزشکار هم سن، به طور معنی داری کمتر است. در تحقیق

1. Hockey

2. Bhanot and Sidhu

3. Callo

4. Demuth

5. Konarski and Matuszynski

6. Singh

بار مبادرت به اجرای آزمون‌های آمادگی جسمانی و آنتروپومتریک نماید، تا قالب و چارچوبی عملی و قابل استناد در کشور فراهم شود. هدف دیگر آن است که از این اطلاعات جهت ارزیابی جسمانی و دست یابی به بهترین عملکرد افراد نخبه در این رشته بهره برداری شود. نتایج این مطالعه می‌تواند مبنایی برای توصیف وضعیت آمادگی جسمانی بازیکنان تیم ملی ایران در نظر گرفته شود تا سایر بازیکنان هاکی مقاطع پایین‌تر با آن مورد ارزیابی قرار گیرند. علاوه بر این‌ها، با توجه به عرصه رقابت جهانی و لزوم آگاهی از شرایط تیم‌های مطرح، سعی خواهد شد با مقایسه توصیفی برخی از این شاخص‌ها با تیم‌های ملی کشورهای مختلف، دیدگاه روشن تری از وضعیت جسمانی و آنتروپومتریک بازیکنان نخبه ایران به دست آید.

روش تحقیق

جامعه و نمونه آماری: پس از هماهنگی با فدراسیون هاکی، موضوع تحقیق و اهمیت آن به اطلاع کادر فنی (سرمربی، مربی بدناساز و سرپرست) تیم ملی هاکی روی چمن رسید. جامعه آماری این پژوهش ۳۵۰ نفر از بازیکنان مستعد هاکی روی چمن سراسر کشور بودند. از این‌بین، ۲۹ نفر که سال ۱۳۹۳ توسط مریبان به اردوی آماده سازی تیم ملی هاکی روی چمن دعوت شده بودند، به عنوان نمونه آماری در این پژوهش شرکت کردند. پیش از شروع پژوهش، مراحل کار برای بازیکنان تشریح گردید و نحوه انجام صحیح هر آزمون، به صورت عملی نشان داده شد. با توجه به طرح تحقیق، در یک روز اندازه‌گیری‌های آنتروپومتریک و در دو روز متوالی، آزمون‌های آمادگی جسمانی به عمل آمد. تعذیه آزمودنی‌ها یک هفتۀ قبل از اجرای تحقیق کنترل شد. در طول این مدت بازیکنان در اردو بودند و از غذای یکسان استفاده می‌کردند. همچنین از آن‌ها خواسته شده بود در طول پژوهش هیچ گونه مکمل ورزشی استفاده نکنند.

کمتر از بازیکنان هندی و پاکستانی بود. بازیکنان تیم ملی هند نیز به طور معنی‌داری کمترین درصد چربی را دارا بودند (۳۵). بویل^۱ و همکارانش در سال ۱۹۹۴ به منظور معین نمودن نیازهای فیزیولوژیک هاکی، ۹ نفر از هاکی‌بازان نخبه مرد را مورد ارزیابی قرار دادند. میانگین ضربان قلب این افراد هنگام بازی ۱۵۹ ضربه در دقیقه و میانگین اکسیژن مصرفی در طول رقابت برابر با ۴۸/۲۰ میلی لیتر بر کیلوگرم در دقیقه بود (۶). آسترینو و همکاران^۲ در سال ۲۰۰۴ در تحقیقی تغییر قابلیت‌های جسمانی ۱۳ هاکی‌باز زن را در طول فصل مسابقات هاکی بررسی نموده و به این نتیجه رسیدند که قدرت اندام تحتانی و فوقانی در طول فصل کاهش معنی‌داری پیدا می‌کند. در حداقل اکسیژن مصرفی^۳ این افراد نیز تغییری بوجود نیامد؛ با این وجود، درصد چربی این افراد در طول فصل و بعد از اتمام فصل مسابقات، کاهش معنی‌داری پیدا کرد. همچنین محققین به این نتیجه رسیدند که تمرینات قبل از فصل بر روی درصد چربی و افزایش وزن اثر گذار بوده اما قدرت عضلانی کاهش یافته است؛ موضوعی که بر اجرای تمرینات قدرتی در طول فصل تأکید دارد (۳). سال ۲۰۰۸ بور^۴ و همکارانش در تحقیقی رابطه بین آمادگی جسمانی و سطح توانایی بازیکنان هاکی را بر روی ۸۵۳ آزمودنی را بررسی کرده و به این نتیجه رسیدند که توان بی‌هوایی در تمامی پست‌های هاکی، مهم‌ترین عامل محسوب می‌شود. به علاوه، شاخص‌های قد، حجم خالص بدن و پرش عمودی عضلانی عوامل مهمی شناخته شدند و پرش عمودی (سارجنت) نیز یک متغیر پیش‌بینی کننده قوی برای استعدادیابی بازیکنان مدافع و مهاجم هاکی، معرفی شد (۷).

علیرغم گزارش‌های مختلفی که در مورد بازیکنان هاکی سایر کشورها وجود دارد، در خصوص نیمرخ آمادگی جسمانی و آنتروپومتریک بازیکنان هاکی روی چمن تیم ملی ایران اطلاعات بسیار اندکی در دست است. از این‌رو تحقیق حاضر قصد دارد برای نخستین

فرمان «حاضر» «رو» با بیشترین سرعت ممکن به طرف مخروط سمت راست که در مسافت ۱۰ متری قرار داشت رفته و بعد از دور زدن آن، با سرعت با عبور از کنار مخروط وسط به طرف مخروط سمت چپ تغییر مسیر دادند. این کار تا زمانی ادامه یافت که آزمودنی ها ۱۰ رفت و برگشت (۲۰۰ متر) را انجام داده باشند. بعد از اتمام آزمون، مدت زمان بر حسب ثانیه و دهم ثانیه ثبت شد (۱۴، ۱۸). آزمون خمس به جلو برای اندازه گیری انعطاف پذیری ناحیه کمر و مفصل ران^۳ استفاده شد؛ بدین صورت که آزمودنی ها در مقابل جعبه انعطاف پذیری نشستند، پاهای خود را به صورت جفت به جعبه انعطاف پذیری چسبانند، بالاتنه را برابر پاهای عمود کرند، تا جای ممکن دست ها را بر روی تخته مدرج کشیدند تا رکورد آن ها بر حسب سانتی متر ثبت شود (۱۸، ۳۳). آزمون پرش زیگزاگ برای اندازه گیری استقامت اندام تحتانی مورد استفاده قرار گرفت؛ به گونه ای که ورزشکاران در کنار چوبی به طول ۳۰ سانتی متر و ارتفاع ۱۵ سانتی متر ایستادند و با فرمان «حاضر» «رو»، کار خود را با پرش از روی چوب شروع کردند. در پایان، تعداد حرکت های درست آن ها ثبت شد (۱۸، ۲۵). آزمون دراز و نشست برای اندازه گیری استقامت عضلانی عضلات ناحیه شکم استفاده شد؛ به شکلی که ورزشکار با کمک آزمون گیرنده به پشت خوابید، زانوها را ۹۰ درجه خم کرد، دست ها به صورت ضربه ری روی سینه قرار گرفت و آزمون شروع گردید. در پایان، تعداد حرکت های درست تو سط آزمون گیرنده ثبت گردید (۱۸، ۳۳).

روش های آماری: از آمار توصیفی برای توصیف داده ها و از آزمون آماری کرووسکال - والیس برای مقایسه خصوصیات هر یک از پست ها با یکدیگر استفاده شد. برای این منظور، از نرم افزار نسخه SPSS ۲۰ بکار گرفته شد و سطح معنی داری $p \leq 0.05$ در نظر گرفته شد.

نحوه اندازه گیری شاخص های آنتروپومتریک: از ترازوی دیجیتالی سکا^۱ ساخت آلمان مدل ۷۲۰ با دقیقه ۱/۰ کیلوگرم برای اندازه گیری وزن و از متر نواری با دقیقه یک میلی متر برای اندازه گیری قد، طول دست ها و قد نشسته استفاده شد. همه اندازه گیری ها توسط یک شخص و با یک ابزار صورت گرفت.

نحوه اندازه گیری شاخص های آmadگی جسمانی: آزمون های آmadگی جسمانی در سالن تمرین تیم ملی در ساعت ۱۶ از ورزشکاران به عمل آمد. آزمون پرش طول جفتی برای اندازه گیری توان^۲ انفحاری اندام تحتانی به کار برده شد. در این آزمون، آزمودنی ها در حالی که نوک پنجه هایشان پشت خط شروع و پاهای حدود ۳۰ سانتی متر از هم فاصله داشت، اقدام به پرش کرده و رکورد آن ها از خط شروع تا پشت پاشنه تو سط آزمون گیرنده بر حسب سانتی متر ثبت شد (۱۸، ۳۳). آزمون ۱۶۰۰ متر برای اندازه گیری توان هوازی به کار برده شد؛ به طوری که ورزشکاران در گروه های چهار نفری تقسیم شدند. هر گروه از آزمودنی ها به ترتیب در پشت خط شروع ایستاده و با صدای سوت کار خود را شروع کردند. پس از اتمام ۱۶۰۰ متر، زمان تو سط آزمون گیرنده بر حسب دقیقه و ثانیه ثبت شد (۱۸). آزمون ۳۶ متر برای اندازه گیری سرعت استفاده شد؛ به گونه ای که آزمودنی ها با علامت آزمون گیرنده کار خود را از پشت خط، شروع کرده در پایان زمان آن ها بر حسب سدم ثانیه و دهم ثانیه ثبت شد (۱۰، ۱۸). از آزمون ایلی نویز^۳ برای اندازه گیری چابکی استفاده شد؛ بدین صورت که ورزشکاران با فرمان «حاضر» «رو» با بیشترین سرعت ممکن کار خود را شروع کرده و از بین مانع ها با تغییر جهت و با حداکثر سرعت عبور کرده و در پایان، مدت زمان طی مسیر آزمودنی ها بر حسب ثانیه و دهم ثانیه ثبت گردید (۱۸، ۲۹). آزمون 10×20 متر برای اندازه گیری استقامت در سرعت آزمودنی ها استفاده شد؛ به طوری که سه مخروط به فاصله ۱۰ متر از هم دیگر روی یک خط مستقیم گذاشته شد. آزمودنی ها پشت مخروط وسط قرار گرفته و با

1. Seca

2. Power

3. Illinois agility test

4. Sit and reach

هاکی و مقایسه این ویژگی ها در پست های مختلف

را نشان می دهد.

یافته ها

جدول ۱ ویژگی های آنتروپومتریک بازیکنان تیم ملی

جدول ۱. توصیف و مقایسه ویژگی های آنتروپومتریک بازیکنان تیم ملی هاکی در هر یک از پست ها

پست ها	سن (سال)	قد (ساقی متر)	وزن (کیلوگرم)	شاخص توده بدن (کیلوگرم بر مترمربع)	قد نشسته (ساقی متر)	طول دستها (ساقی متر)
دروازبان ها	۲۱/۷±۴/۲+	۱۷۷±۵/۷+	۷۷/۲±۵/۲+	۲۲/۱±۲/۴+	۹۴±۶/۷+	۱۸۱/۲±۶/۱+
مدافع ها	۲۲/۵±۲/۲+	۱۷۸±۸/۲+	۷۷/۱±۱/۶۶	۲۲/۱±۱/۶۶	۹۴/۳±۵/۱۰	۱۸۰/۴±۲/۸+
هافبک ها	۲۲/۷±۲/۵+	۱۷۶/۲±۲/۸+	۷۷/۸±۸/۷+	۲۲/۲±۲/۸+	۹۳/۵±۴/۹۰	۱۷۷/۷±۲/۰
مهاجره ها	۲۴/۲±۴/۶	۱۸۷/۲±۲/۶+	۷۷/۲±۲/۶+	۲۱/۷±۱	۹۷/۳±۲/۵۰	۱۸۵/۴±۲/۷+
p	۰/۵۱	۰/۲۴	۰/۹۴	۰/۴۴	۰/۲۲	+/۲۲

در جدول ۲ نتایج آزمون های آمادگی جسمانی بازیکنان تیم ملی هاکی و مقایسه این ویژگی ها در پست های مختلف نشان داده شده است.

جدول ۲. توصیف و مقایسه ویژگی های آمادگی جسمانی بازیکنان تیم ملی هاکی در هر یک از پست ها

ویژگی های آمادگی جسمانی	دروازبان ها	مدافع ها	هافبک ها	مهاجره ها	p
سرعت (ثانیه)	۵/۲۹±۰/۲۸	۵/۰۴±۰/۱۱	۴/۹۹±۰/۲۲	۵/۱۱±۰/۰۹	+/۰۶
چاکری (ثانیه)	۱۵/۸۵±۰/۵۳	۱۷/۰۴±۰/۷۷	۱۵/۲۰±۰/۴۱	۱۵/۴۲±۰/۰۹	+/۰۶
استقامت در سرعت (ثانیه)	۴۴/۳۷±۰/۸۰	۴۸/۷۲±۰/۶۶	۴۲/۸۷±۰/۷۵	۴/۵۹±۰/۷۳	+/۰۸
توان اندام تحتانی (ساقی متر)	۲۴۰/۲۰±۱۵/۵۰	۲۴۵±۱۴/۱۰	۲۴۵/۳۰±۱۶/۵۰	۲۴۹/۴۰±۹/۴۰	+/۷۱
انعطاف تنہ (ساقی متر)	۳۶±۵/۹۰	۳۵/۰۵±۰/۵۰	۳۲/۰۸±۰/۷۰	۲۷/۴۰±۱/۸۰	+/۷۰
استقامت قلبی عروقی (ثانیه)	۳۹۲	۳۵۷	۳۴۲±۰/۰۲	۳۶۸±۰/۰۲	+/۱۴
استقامت عضلات ناحیه شکم (تعداد)	۶۲/۷۰±۶/۲۰	۶۱/۷۰±۶/۳۰	۵۷/۶۰±۶/۰۰	۵۶/۴۰±۴/۸۰	+/۰۶
استقامت عضلات اندام تحتانی (تعداد)	۱۳۶/۷۰±۱۰/۰۰	۱۴۰±۱۲/۰۰	۱۴۲/۰۵±۰/۰۵	۱۴۰/۰۵±۰/۰۵	+/۹۱

نداد. در جدول ۳ به مقایسه عوامل آنتروپومتریک بازیکنان هاکی تیم های ملی کشورهای مختلف جهان با بازیکنان ایران پرداخته شده است.

آزمون آماری کروسکال والیس از لحاظ آماری تفاوت معنی داری در هیچ یک از ویژگی های آنتروپومتریک و آمادگی جسمانی در سطوح پست های چهار گانه نشان

جدول ۳. مقایسه ویژگی های آنتروپومتریک بازیکنان هاکی تیم های ملی کشورهای مختلف جهان با تیم ملی ایران

منابع	شاخص توده بدن (کیلوگرم بر مترمربع)	قد (سانتی متر)	وزن (کیلوگرم)	سن (سال)	شاخص ها تیم ها
دموث و همکاران(۱۳)	۲۴/۳۵	۱۷۰/۵۰	۷۰/۴۰	۲۵/۳۱	مالزی
دموث و همکاران(۱۳)	۲۴/۲۸	۱۷۱/۹۰	۷۰/۹۰	۲۶/۴۴	چین
دموث و همکاران(۱۳)	۲۳/۵۱	۱۷۷/۲۰	۷۳/۶۰	۲۶/۳۶	لهستان
دموث و همکاران(۱۳)	۲۳/۴۳	۱۷۹/۲۰	۷۵/۰۰	۲۵/۲۰	سوئیس
ویدرو همکاران(۳۶)	۲۵/۳۲	۱۷۰/۰۰	۷۳/۰۲	----	استرالیا
سینگ و همکاران(۳۵)	۲۲/۵۷	۱۷۲/۶۰	۶۶/۶۰	۲۰/۵۴	هند
سینگ و همکاران(۳۵)	۲۲/۴۹	۱۷۱/۱۰	۶۵/۴۰	۲۲/۵۵	سریلانکا
سینگ و همکاران(۳۵)	۲۴/۳۷	۱۷۲/۲۰	۷۱/۹۰	۱۹/۹۰	پاکستان
پژوهش حاضر	۲۲/۸۸	۱۷۶/۸۰	۷۱/۶۰	۲۳/۶۰	ایران

(۲۰/۲۴ سال) تفاوت معنی داری وجود ندارد. چنین اظهار گردیده است که در هاکی روی چمن معمولاً دروازه بانان ها و مدافعان از میانگین سنی بالاتری برخوردارند و این موجب تجربه بیشتر در این دو پست بازی نسبت به خط میانی و حمله می شود (۳۰). شاید وجود چنین وضعیتی در تیم ایران به دلیل کمبود بازیکنان در این پستها و سرمایه گذاری مریبان تیم ملی روی بازیکنان جوان باشد.

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که میانگین قد بازیکنان ایران ۱۷۶/۵۸ سانتیمتر است، در حالی که مهاجم ها با میانگین ۱۸۲/۲۰ سانتیمتر به طور غیر معنی دار بلندقدتر از دروازه بان ها (میانگین ۱۷۷ سانتیمتر)، مدافع ها (میانگین ۱۷۶ سانتیمتر) و هافبک ها (میانگین ۱۷۴/۲۰ سانتیمتر) می باشند. کونارسکی (۲۰۱۰) در مطالعه ای که روی ۲۵ نفر از بازیکنان تیم ملی لهستان انجام داد، میانگین قد بازیکنان هاکی روی چمن این کشور را ۱۷۸ سانتیمتر اعلام کرد،

بحث اطلاعات بسیار اندکی در مورد بازیکنان تیم ملی هاکی روی چمن ایران وجود دارد و این تحقیق با اندازه گیری برخی ویژگی های آمادگی جسمانی و آنتروپومتریک بازیکنان دعوت شده به تیم ملی در سال ۱۳۹۳ این امکان را فراهم ساخت تا دیدگاه بهتری در مورد بازیکنان ایرانی به دست آید. تحلیل دقیق تر و موثرتر اطلاعات به دست آمده، نیاز به مقایسه وضعیت بازیکنان ایرانی با ورزشکاران سایر کشورها دارد، اما به دلیل تفاوت در نحوه و نوع اجرای آزمون ها در تحقیقات مختلف، امکان دقیق مقایسه وضعیت بازیکنان ایرانی با بازیکنان سایر کشورها وجود ندارد.

مطالعه حاضر نشان داد که میانگین سن کل بازیکنان ایران ۲۳/۴۴ سال است و بین سن بازیکنان در پست دروازه بانی (میانگین ۲۱/۷ سال)، مدافع ها (۲۳/۵ سال)، هافبک ها (۲۳/۷۰ سال) و مهاجم ها

ها میانگین وزن بازیکنان حرفه‌ای هاکی کشور هلند ۶۷/۳ کیلوگرم، آفریقای جنوبی ۷۵/۲۰ کیلوگرم، مالزی ۷۰/۴۰ کیلوگرم، سوئیس ۷۵/۵۰ کیلوگرم و چین ۶۸/۵۰ کیلوگرم بیان شده است (۳۰، ۱۲). با توجه به این که عملکرد بازیکنان هاکی روی چمن تحت تأثیر ترکیب بدن قرار می‌گیرد، بدن نسبتاً لاغر (تیپ بدنی آکتومورف) برای ورزش هاکی روی چمن مطلوب تر است (۱۵، ۲۶)، لذا میانگین وزنی ثبت شده از بازیکنان ایران و مقایسه آن با سایر کشورها، نشان از وضعیت مطلوب آن ها در این خصوص دارد.

میانگین شاخص توده بدن بازیکنان ایران ۲۲/۲۸ کیلوگرم بر مترمربع به دست آمد و مشخص گردید از این حیث هافبکها ۲۳/۲۰ کیلوگرم بر مترمربع) دارای میانگین بالاتری (غیر معنی دار) نسبت به بازیکنان مدافع (۲۳/۱۰ کیلوگرم بر مترمربع، دروازه‌بان ها (۲۳/۱۰ کیلوگرم بر مترمربع) و مهاجم ها ۲۱/۷۰ کیلوگرم بر مترمربع) هستند. میانگین شاخص توده بدن بازیکنان تیم ملی لهستان ۲۳/۱۲ کیلوگرم بر مترمربع (۱۹) و بازیکنان تیم ملی هلند ۲۱/۹۲ کیلوگرم بر مترمربع (۲۸) گزارش شده است. مقایسه یافته‌های این پژوهش با پژوهش‌های خارجی نشان می‌دهد که بازیکنان ایران تفاوت چندانی با بازیکنان لهستانی و هندی ندارند و با توجه به این که شاخص توده بدن در هاکی روی چمن یک عامل مهم به حساب می‌آید (۱۵، ۲۶)، ترکیب بدنی بازیکنان ایرانی در وضعیت نسبتاً خوبی قرار دارد.

میانگین قد نشسته بازیکنان ایرانی ۹۴/۱۳ سانتیمتر ثبت شد به گونه‌ای که این مقدار در بازیکنان مهاجم (۹۷/۲۰ سانتیمتر) به طور غیر معنی دار بیشتر از مدافع ها (۹۴/۲۰ سانتیمتر)، دروازه‌بان ها (۹۴ سانتیمتر) و هافبکها (۹۳/۵ سانتیمتر) است. به علاوه، میانگین طول دو دست بازیکنان تیم ملی ایران ۱۸۰/۳۳ سانتیمتر به دست آمد و مشخص گردید که این مقدار در مهاجم ها (۱۸۱/۲۰ سانتیمتر) به طور غیر معنی دار بیشتر از دروازه‌بان ها (۱۸۱/۲۰ سانتیمتر)، مدافع ها (۱۸۰/۴۰ سانتیمتر) و هافبکها

در حالی که میانگین قد مهاجم ها (۱۷۰ سانتیمتر) کمتر از مدافع ها (میانگین ۱۷۹ سانتیمتر) و هافبکها (میانگین ۱۸۰ سانتیمتر) بود (۲۲). نتایج تحقیقات دیگر در مورد قد بازیکنان حرفه‌ای هاکی نشان داده است که میانگین قد بازیکنان حرفه‌ای هلند ۱۷۷/۳۰ سانتیمتر، بازیکنان چین ۱۷۱/۹۰ سانتیمتر، بازیکنان ۱۷۹/۲۰ سانتیمتر، بازیکنان سوئیس ۱۷۹/۵۰ سانتیمتر و بازیکنان آفریقای جنوبی ۱۷۶/۳۰ سانتیمتر است (۱۱، ۲۶). هیراتا^۱ (۱۹۶۶) میانگین قد بازیکنان هند قهرمان المپیک ۱۹۶۶ توکیو را ۱۷۳ سانتیمتر گزارش کرده است (۲۶). از نظر بسیاری از پژوهشگران، طول قامت یک مزیت مهم برای بعضی پست‌های بازی مانند دروازه‌بانی، حمله و دفاع می‌باشد (۲۴، ۳۰). نتایج به دست آمده دال بر آن است که میانگین قد بازیکنان هاکی تیم ملی ایران نسبت به سایر کشورها، در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دارد.

میانگین وزن بازیکنان تیم ملی هاکی روی چمن ۷۱/۶۸ کیلوگرم است، در حالی که مهاجم ها با میانگین ۷۲/۲۰ کیلوگرم و دروازه‌بان ها ۷۲/۲۰ کیلوگرم، از وزن بیشتر غیر معنی داری نسبت به مدافع ها با میانگین ۷۲/۱۰ کیلوگرم و هافبکها با ۷۰/۸۰ کیلوگرم برخوردارند. بانوت و سیدهو^۲ (۱۹۸۳) نشان داده اند که در بازیکنان تیم ملی هاکی روی چمن هند، میانگین وزنی مدافعان (۶۸/۵۳ کیلوگرم) از هافبکها (۶۳/۵۳ کیلوگرم)، دروازه‌بان ها (۶۱/۹۳ کیلوگرم) و مهاجم ها (۶۱/۳۳ کیلوگرم) بیشتر است (۵). کونارسکی و ماتسرزینسکی (۲۰۰۶) میانگین وزن بازیکنان ملی لهستانی را ۷۱/۳۶ کیلوگرم گزارش کرده اند که در این میان، میانگین وزن بازیکنان مدافع بیشتر از مهاجم ها و هافبکها بوده است (۲۳). کونارسکی (۲۰۱۰) در مطالعه‌ای دیگر روی بازیکنان تیم ملی لهستان، میانگین وزن آن‌ها را ۷۲/۹۰ کیلوگرم گزارش کرد به طوری که وزن بازیکنان مدافع بیشتر از هافبکها و مهاجم ها بوده است (۲۲). میانگین وزن بازیکنان هند قهرمان المپیک ۱۹۶۶ توکیو ۶۹/۰۲ کیلوگرم گزارش شده است (۳۰). در سایر گزارش

با توجه به نبود نورم ملی و تفاوت در جنسیت و نوع آزمون، امکان مقایسه با سایر اطلاعات وجود ندارد؛ اما می‌توان اظهار داشت که چابکی یکی از عوامل مهم در بازی هاکی روی چمن محسوب می‌شود (۲۹، ۳۰). در کل، نتایج به دست آمده با انتظاراتی که از وظایف بازیکنان در پست‌های مختلف داشتیم، همان‌نگ است و به نظر می‌رسد بازیکنان ایرانی چابکی مطلوب دارند.

نتایج این پژوهش در مورد عملکرد استقامت در سرعت که با استفاده از دوی 10×20 متر اندازه‌گیری شد، نشان داد که میانگین استقامت در سرعت بازیکنان نخبه هاکی ایران $45/32$ ثانیه است و در این میان، مهاجم‌ها ($43/59$ ثانیه) بهتر از هافبک‌ها ($43/86$ ثانیه)، دروازه‌بان‌ها ($44/27$ ثانیه) و مدافعان ($48/73$ ثانیه) می‌باشند. تعداد محدودی از مطالعات با استفاده از آزمون 10×20 متر که شامل افزایش و کاهش سرعت می‌باشد، استقامت در سرعت را ارزیابی کرده‌اند. بر اساس وظایف بازیکنان در پست‌های مختلف محققین انتظار داشته‌اند که مدافعان و مهاجمان عملکرد سرعتی بهتری نسبت به بازیکنان خط میانی داشته باشند (۱۳، ۲۸، ۳۰)؛ که با یافته‌های تحقیق حاضر همسو نیست. این موضوع می‌تواند به دلیل متناسب نبودن ویژگی‌های تمرین مربیان برای هر پست از بازی باشد و به مسئولان مربوطه پیشنهاد می‌شود که در برنامه‌های آماده‌سازی ورزشکاران از اصول علمی، افراد متخصص در زمینه علم تمرین و فیزیولوژی ورزش، استفاده شود.

بر اساس یافته‌های به دست آمده، میانگین توان اندام تحتانی در بازیکنان تیم ملی ایران $245/23$ سانتیمتر به دست آمد و مقایسه بازیکنان پست‌ها نشان داد که این شاخص در بازیکنان مهاجم ($249/40$ سانتیمتر) به طور غیر معنی دار بیشتر از مدافع ($245/40$ سانتیمتر)، هافبک‌ها ($245/30$ سانتیمتر) و دروازه‌بان‌ها ($240/20$ سانتیمتر) می‌باشد. بسیاری از فعالیت‌ها در هاکی روی چمن انفحاری و نیرومند

($177/70$ سانتیمتر) است. متأسفانه به دلیل در دسترس نبودن اطلاعات کافی در مورد این دو ویژگی، امکان مقایسه بین بازیکنان هاکی روی چمن ایران با سایر کشورها وجود ندارد.

علاوه بر ویژگی های آنتروپومتریک که بدن پرداخته شد، برخی از عوامل آمادگی جسمانی نیز در بازیکنان تیم ملی ایران اندازه گیری گردید. در ارزیابی سرعت با آزمون 36 متر، میانگین $5/06$ ثانیه ($4/99$ ثانیه) به دست آمد که این مقدار در هافبک‌ها ($5/02$ ثانیه)، مهاجم‌ها ($5/11$ ثانیه) و دروازه‌بان‌ها ($5/29$ ثانیه) بود. مطالعه کیوق و همکاران^۱ ($200/3$) در مورد بازیکنان هاکی زن تیم ملی کانادا، میانگین سرعت 40 متر برابر $6/53$ ثانیه را به ثبت رسانده است (۲۱) که هم از نظر جنسیت و هم نوع آزمون با تحقیق حاضر تفاوت دارد. بر اساس سایر یافته‌ها، زمان اجرای دوی 10 متر سرعت در بازیکنان هاکی استرالیا $1/81$ ثانیه بوده است (۲۱). بر اساس وظایف بازیکنان در پست‌های مختلف، انتظار می‌رفت بازیکنان مدافعان و مهاجم، عملکرد سرعتی بهتری داشته باشند تا بازیکنان خط میانی (۳۰). این موضوع می‌تواند به دلیل متناسب نبودن ویژگی تمرین‌های مربیان برای هر پست از بازی باشد. با توجه به این که در هر کدام از پست‌های بازی، سطح مطلوبی از شاخص‌های آمادگی جسمانی نیاز می‌باشد، به مربیان تیم ملی پیشنهاد می‌شود در آماده‌سازی ورزشکاران نیازهای هر پست در نظر گرفته شود.

میانگین چابکی بازیکنان هاکی تیم ملی ایران $15/96$ ثانیه به دست آمد که در هافبک‌ها ($15/20$ ثانیه) بهتر از مهاجم‌ها ($15/42$ ثانیه)، دروازه‌بان‌ها ($15/85$ ثانیه) و مدافعان ($17/04$ ثانیه) می‌باشد. این تفاوت از نظر آماری بین پست‌ها معنادار نبود ($p=0/60$). کیوق و همکاران ($200/3$) میزان چابکی ورزشکاران ملی زن کانادا را با استفاده از آزمون ایلینویز سنجیده و میانگین زمان $16/68$ ثانیه را گزارش کرده‌اند (۲۱).

پایین ترین استقامت قلبی-عروقی را دارند (۳۰) که با یافته‌های این تحقیق همسو است. این موضوع می‌تواند به دلیل این باشد که مدافعان و بازیکنان میانی در طول بازی جابه‌جایی بیشتری نسبت به بازیکنان دیگر پست‌ها دارند و بیشتر می‌دوند.

میانگین استقامت عضلات ناحیه شکم که با آزمون درازونشست اندازه‌گیری شد معادل $59/64$ تعداد به دست آمد و این در حالی که رکورد دروازه‌بان‌ها ($63/70$ تعداد)، هافبک‌ها ($57/60$ تعداد) و مهاجمان ($56/40$ تعداد) می‌باشد. با توجه به این که استقامت عضلانی به ترتیب در هافبک‌ها، مهاجمان، مدافعان و دروازه‌بانان از اهمیت برخوردار می‌باشد (۲۵، ۲۸)، بنابراین نتایج تحقیق حاضر نشان داد که در این شاخص، بازیکنان ایران در وضعیت مطلوبی در مقایسه با پست‌های بازی قرار ندارند و این می‌تواند ناشی از متناسب نبودن ویژگی‌های تمرين مربیان برای هر پست از بازی باشد. مسئولان بلند پایه فدراسیون باشیستی در زمینه آماده سازی تیم ملی وقت بیشتری را به مربیان بدھند، هر چند مربیان تیم‌های ملی نیز باشیستی با بهره‌گیری از افراد تحصیل کرده و متخصص در علم تمرين، به رفع ضعف‌هایی از این قبیل بپردازند.

میانگین استقامت اندام‌های تحتانی که با آزمون پرش زیگزاگ اندازه‌گیری شد، نشان داد که میانگین این شاخص در بازیکنان تیم ملی ایران معادل $140/61$ تعداد است، در حالی که این شاخص در هافبک‌ها ($142/50$) تعداد به طور غیر معنی دار بهتر از مهاجمان ($140/60$) تعداد و مدافعان ($140/30$ تعداد) و دروازه‌بانان ($136/70$) تعداد بود. متأسفانه در مورد این شاخص هم اطلاعی در دست نیست تا مورد مقایسه قرار گیرد. با این حال، بر اساس وظایف بازیکنان در پست‌های مختلف، انتظار می‌رود دروازه‌بان‌ها و مدافعان عملکرد استقامت بهتری نسبت به هافبک‌ها و مهاجمان داشته باشند (۲۵، ۳۰)؛ لذا به مربیان تیم ملی پیشنهاد می‌شود با توجه به نیازهای مختلف کدام از پست‌های بازی، در تمرينات آماده‌سازی به این شاخص توجه شود.

هستند و نیاز به توان بالای پاهای نیز برای بازیکنان این رشتہ ضروری است (۳۳، ۳۰، ۲۵). اسکات (۱۹۹۱) میانگین میزان پرش طول جفت تیم ملی زنان هاکی آفریقای جنوبی را 230 سانتیمترگزارش کرده است (۳۳). بر اساس یافته‌های جان‌گور (۲۰۰۳)، میزان پرش عمودی بازیکنان هاکی روی چمن استرالیا 56 سانتیمتر بدست آمده است (۱۷). بر اساس وظایف بازیکنان در پست‌های مختلف، دروازه‌بان‌ها، مهاجمان‌ها و مدافع‌ها از توان اندام تحتانی بیشتری نسبت به بازیکنان میانی برخوردارند (۳۱، ۲۹، ۱۹) که با یافته‌های تحقیق ناهمسو است. از این رو پیشنهاد می‌شود مربیان تیم ملی کشورمان با بهره‌گیری از افراد متخصص در حیطه استعدادیابی و علم تمرين، در رابطه با چگونگی انتخاب بازیکنان با توجه به نیازهای آمادگی جسمانی برای هر پست به رفع این مشکل بپردازند.

میانگین انعطاف پذیری بازیکنان تیم ملی ایران در آزمون خمش به جلو معادل $33/60$ سانتیمتر به دست آمد، به گونه‌ای که این مقدار در دروازه‌بان‌ها (36 سانتیمتر) به طور غیر معنی دار بیشتر از مدافعان ($35/50$ سانتیمتر)، هافبک‌ها ($32/60$ سانتیمتر) و مهاجمان ($27/40$ سانتیمتر) بود. متأسفانه نبود تحقیق مشابه خارجی مقایسه این شاخص و بحث در مورد آن را مشکل می‌سازد، با این حال در متون متعددی آمده است که انعطاف‌پذیری دروازه‌بان‌ها نسبت به سایر پست‌ها بیشتر است و پس از آن مدافعان، هافبک‌ها و مهاجمان قرار دارند (۳۱، ۲۹، ۲۵).

بازیکنان هاکی روی چمن با در نظر گرفتن پست بازی، در طول یک مسابقه حدود 10870 تا 9300 متر می‌دونند (۳۱، ۲۴، ۲۲). نتایج تحقیق حاضر در مورد استقامت قلبی-عروقی که با استفاده از دو 1600 اندازه‌گیری شد، نشان داد میانگین بازیکنان ایرانی در این آزمون $358/55$ ثانیه است، در حالی که این شاخص در هافبک‌ها (342 ثانیه) به طور غیر معنی دار بهتر از مدافعان (357 ثانیه)، مهاجمان (368 ثانیه) و دروازه‌بان‌ها (392 ثانیه) بود. بر اساس نتایج بدست آمده از بازیکنان نخبه اروپایی، بازیکنان دفاع و میانه زمین بالاترین مقادیر و دروازه‌بانان و مهاجمان

توجه نمی شود. اطلاعات و داده های به دست آمده از این پژوهش معیارهای مناسب و ارزنده برای ارزیابی وضعیت بازیکنان و انتخاب و گزینش آنان برای رشته هاکی روی چمن در اختیار می گذارد.

قدرتدانی و تشکر

از همه کسانی که ما را در این پژوهش یاری نمودند به ویژه دکتر سجاد احمدی زاد مدیر گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی، فدراسیون هاکی جمهوری اسلامی ایران و هیئت هاکی استان قم، صمیمانه کمال تشکر را داریم.

نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده، بازیکنان تیم ملی ایران در کل در سطح مطلوبی از حیث اکثر شاخص های آنتروپومتریک و توان هوایی، انعطاف پذیری و چابکی قرار دارند. اگر چه میانگین شاخص سرعت، توان اندام تحتانی، استقامت در سرعت و استقامت اندام تحتانی بازیکنان تیم ملی ایران در مقایسه با نتایج تحقیقات دیگر مناسب به نظر می رسد، با این حال عدم وجود تفاوت معنی دار در پست های مختلف بازی و بالاتر بودن رکورد بازیکنان میانی از مدافعان و مهاجمان، دال بر آن است که احتمالاً به تمرينات تخصصی بر اساس پست بازی

منابع

1. Anders, E., Myers, S. 1999. *Field hockey steps to success*. Auckland: Human Kinetics, pp. 5-8.
2. Arab, A.E., Dehkholde, M.R., Taheri, M., Khanipur, H. 1389. Assessment of the fitness profile of taekwondo women's national team. *Sports Sciences*, vol. 2, no. 3, pp. 63-76. [Persian]
3. Astorino, T.A., Tam, P.A., Rietschel, J.C., Johnson, S.M., et al. 2004. Changes in physical fitness parameters during a competitive field hockey season. *The Journal of Strength & Conditioning Research*, vol. 18, no. 4, pp. 850-854.
4. Bhanot, J., Sidhu, L. 1983, Maximal anaerobic power in Indian national hockey players. *British Journal of Sports Medicine*. vol. 17, no. 1, pp. 34-39.
5. Bloomfield, J.R., Polman, Donoghue, P., Mcnaughton, L. 2007. Effective speed and agility conditioning methodology for random intermittent dynamic type sports. *Journal of Strength & Conditioning Research*, vol. 2, no. 4, pp. 1093-1100.
6. Boyle, P.M., Mahoney, C.A., Wallace, W.F., 1994. The Competitive demands of elite male field hockey players. *Journal of Sports Medicine and Physical fitness*, vol. 34, no. 3, pp. 235-241.
7. Burr, J.F., Jamnik, R.K., Baker, J., Macpherson, A., et al. 2008. Relationship of physical fitness test results and hockey playing potential in elite-level ice hockey players. *Journal of Strength & Conditioning Research*, vol. 22, no. 5, pp. 1535-1543.
8. Callan, S.D., Brunner, D.M., Devolve, K.L., Mulligan, S.E., et al. 2000. Physiological profiles of elite freestyle wrestlers. *The Journal of Strength & Conditioning Research*, vol. 14, no. 2, pp. 162-169.
9. Calo, C.M., Sanna, P.S., Vona, I.S. 2009. Body composition of Italian female hockey players. *Biology of Sport*, vol. 26, no. 1, pp. 24-31.
10. Carolina, F., Emanuel, J., Jaques, H.A. 2002. Prediction function for identifying talent in 14-to15-year-old female field hockey players. *High Ability Studies*, vol. 13, no. 1, pp. 22-33.
11. Christopher, J.G. 2003. Physiological tests for elite athletes. *Human Kinetics New Zealand*, vol. 1, no.3, pp. 356-360.
12. Demuth, A., Czerniak, U., Krzykala, M., Wielinski, D., et al. 2007. Somatic characteristic of players from chosen national teams of field hockey. *Human Movement*, vol. 22, no. 5, pp. 149-160.
13. Durandt, J.J., Revington, P., Allan, T., Lamberts, R. 2007. Physical profiles of elite male field hockey soccer player-application to sport-specific tests. *South African Journal of Sports Medicine*, vol. 19, no. 3, pp. 74-78.
14. Ebrahim, K., 1388. Principles and methodology of training from childhood to the championship. Second edition, *Sport Sciences Research Center*, pp. 25-30. [Persian]
15. Elferink-Gemser, M.T., Visscher, C., Van Duijn, M.A., Lemmink, P.M. 2006. Development of the interval endurance capacity in elite and sub-elite youth field hockey players. *British Journal of Sports Medicine*, vol 40, no. 4, pp. 340-345.
16. Ferguson, G.A., Yeshiva, T. 2007. Applied probability and statistics in psychology and educational sciences. Translated by: Delaware, A. and Nahgshband, S., *Arasbaran Publication*, no. 5. [Persian]
17. Gaeini, A.A., Shahin Tabé, M. 1378. Evaluation and comparison of some anthropometric characteristics, physiological and skill performance indicators between basketball players of the national team national team young of with adults. *Olympic Quarterly*, vol. 7, no. 3-4, pp. 65-78.
18. Gharakhanlou, R., Cordy, M.R., Gaeini, A.A., Alizadeh, H. et al. 1386. *Tests for measurement of physical, skill and mental fitness in elite athletes of different sports*. 2th edition. National Olympic Committee of the Islamic Republic of Iran Publication, pp. 25-80.
19. Groger, A., Oettl, G.M., Tusker, F. 2001. Anthropometry and muscle force measurement of German male national junior hockey players. *Sportverletzung Sportschaden: Organ der Gesellschaft für Orthopädisch-Traumatologische Sportmedizin*, vol. 15, no. 4, pp. 87-99.
20. Hughes, M.D., Bartlett, R.M. 2002. The use of performance indicators in performance analysis. *Journal of Sport Sciences*, vol. 20, no. 10, pp. 739-754.

21. Keogh, J.W., Weber, C.L., Dalton, C.T. 2003. Evaluation of anthropometric physiological and skill-related tests for talent identification in female field hockey. *Canadian Journal of Applied Physiology*, vol. 28, no. 3, pp. 397- 409.
22. Konarski, J. 2010. Characteristics of chosen parameters of external and internal loads in eastern European high level field hockey players. *Journal of Human Sport & Exercise*, vol. 5, no. 1, pp. 321-333.
23. Konarski, J., Matuszynski, M.A., Strzelczyk, R., Yszar. D. 2006. Different team defense tactics and heart rate during a field hockey match. *Studies in Physical Culture and Tourism*, vol. 3, no. 4, pp. 145-148.
24. Kruger, A. 2010. Sport psychological skills that discriminate between successful and less successful female university field hockey players. *African Journal for Physical, Health Education, Recreation & Dance*. vol. 16, no. 2, pp. 244-248.
25. Malhotra, M.N., Joseph, A. 1974. Body composition and endurance capacity of Indian hockey players. *The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness*, vol. 14, no. 4, pp. 272-279.
26. Manna, L., Khanna, G.L., Dhara, P.C. 2009. Training induced changes on physiological and biochemical variables of young Indian field hockey players. *Biology of Sport*, vol. 26, no. 1, pp. 33-43
27. Parno, A.H., Gharakhanlou, R., Agha Ali Nejad, H. 1384. Profile of body composition, physiological and anthropometric characteristics of elite futsal players in Iran. *Journal of Olympic*, vol. 13, no. 2, pp. 35-40. [Persian]
28. Podgórska, T., Krysciak, J., Pawlak, M., Konarski, J., et al. 2011. Metabolic acidosis as a consequence of maximal effort in female field hockey players in an annual training cycle. *Studies in Physical Culture and Tourism*, vol. 18, no. 3, pp. 20-29.
29. Ready, A.E., Van der Merwe, M. 1986. Physiological monitoring of the 1984 Canadian women's olympic field hockey team. *Australian Journal of Science and Medicine in Sport*, vol. 18, no. 3, pp. 13-22.
30. Reilly, T., Borrie, A. 1992. Physiology applied to field hockey. *Sports Medicine*, vol. 14, no. 1, pp. 10 - 26.
31. Robert, G.P. 2003. The ultimate guide to weight training in field hockey. Translated by: Bakhtiyari, A. Qom. *Publication Shajareh Taybeh*, pp. 5. [Persian]
32. Salimi, A., Baranchy, M., Koneshlu, S. 2014. Profile of physical fitness, anthropometric and body composition characteristics of players of young volleyball national team. *Sport Biosciences*, vol. 6, no. 1, pp. 21-39. [Persian]
33. Scott, P.A. 1991. Morphological characteristics of elite male field hockey players. *Journal of sports medicine and physical fitness*, vol. 31, no. 1, pp. 57-61.
34. Shyamal, K., Santosh, J., Jaspal Singh, S. 2012. Study of back strength and its association with selected anthropometric and physical fitness variables in inter-university hockey players. *Anthropologist*, vol. 14, no. 4, pp. 359-368.
35. Singh, M., Kanwar, M.S., Kanwaljeet, S. 2009. Anthropometric measurements body composition and physical parameters of Indian Pakistani and sari Lankan field hockey player. *Journal of sports sciences*, vol. 4, no. 2, pp. 47-52.
36. Withers, R.T., Roberts, G.D., Davies, J. 1977. The maximum aerobic power, anaerobic power and body composition of south Australian male representatives in athletics, basketball, field hockey and soccer. *Journal of Sports Medicine*, vol. 13, no. 2, pp. 391-400.

Abstract

The anthropometric and physical fitness profile of Iranian's national field hockey players in different positions

Ali Bakhtiyari¹, Khosrow Ebrahim², Habib Aghaee³, Abolfazl Yousefi⁴

Background and Aim: The physical fitness, form and the anatomy of the athletes have a significant role for their succession; therefore the present research aimed to describe the anthropometric and physical fitness profile of the Iranian's national field hockey players. **Materials and Methods:** 29 players in the Iranian's national team camp took part in the research voluntarily, with average age of 23.42 ± 3.61 yr., height of 176.8 ± 7.17 cm, weight of 71.62 ± 8.32 kg. This group of players were consisted of four different positions; 4 goalkeepers, 10 defenders, 10 midfielders, and 5 strikers. The anthropometric characteristics including weight, BMI, sitting height, the arms' length were measured by standard methods. Moreover, the physical fitness factors also were measured by following tests: 36 meters shuttle run, Illinois test, 10×20 meter, standing long jump, bending forward, 1600 meters, sit and reach, and Zig Zag jumps test. The statistical analysis was calculated using SPSS v.20 and MS Excel, through which the anthropometric and the physical fitness profile of the players in each position. **Results:** The BMI of other characteristics of the goalkeepers, defenders, midfielders, and strikers are as follow respectively; 23.11 ± 2.41 kg/m², 23.11 ± 1.6 kg/m², 23.21 ± 1.7 kg/m², 21.71 ± 1 kg/m²; the sitting height 94 ± 4.71 cm, 94.21 ± 5.11 cm, 93.51 ± 4.91 cm, 97.21 ± 3.51 cm; the arms' length 181.23 ± 6.11 cm, 180.44 ± 8.63 cm, 177.74 ± 8.06 cm, 185.43 ± 7.65 cm; the speed 5.29 ± 0.28 sec, 5.02 ± 0.11 sec, 4.99 ± 0.22 sec, 5.11 ± 0.09 sec; the agility 15.85 ± 0.53 sec, 17.04 ± 0.77 sec, 15.2 ± 0.41 sec, 15.42 ± 0.93 sec; the speed endurance 44.37 ± 0.8 sec, 48.73 ± 1.66 sec, 43.86 ± 0.75 sec, 43.59 ± 0.73 sec; the lower limb power 240.2 ± 15.53 cm, 245.43 ± 14.13 cm, 245.33 ± 16.53 cm, 249.48 ± 9.43 cm; the flexibility 36 ± 5.93 cm, 35.58 ± 5.43 cm, 32.61 ± 7.70 cm, 27.42 ± 10.82 cm; the cardiovascular endurance 392 sec, 357 sec, 342 ± 0.02 sec, 368 ± 0.02 sec; the abdominal muscles endurance 63.76 ± 6.21 no, 61.78 ± 4.35 no, 57.68 ± 4.59 no 56.49 ± 4.84 no; and the lower limb muscles endurance 136.79 ± 10.65 no, 140.32 ± 13.60 no, 142.52 ± 5.50 no, 140.60 ± 10.90 no. **Conclusion:** The anthropometric characteristics of the Iranian players holding different positions are at favorable level, although they have weaknesses regarding most of the physical fitness parameters.

Keywords: Physical fitness, Talent identification, Anthropometry, Field hockey.

Journal of Practical Studies of Biosciences in Sport, vol. 2, no. 4, Fall & Winter, 2014/2015

Received: 28 Jun, 2013

Accepted: 7 Aug, 2013

1. Corresponding Author, M.S. in Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran, Address: Tehran, Evin, Shahid Beheshti University, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, E-mail: bakhtiyari.ali2012@gmail.com
2. Full Professor, Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
3. M.S. in Physical Education, Department of Exercise Physiology, Shahid Rajaei University, Tehran, Iran.
4. M.S. in Physical Education, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Islamic Azad University-Mahallat Branch, Arak, Iran.